

5 EUROPSKA SEDMICA IMUNIZACIJE



Spriječi

Zaštiti

Imuniziraj

5 EUROPSKA SEDMICA IMUNIZACIJE



Spriječi

Zaštiti

Imuniziraj

Od 24. aprila do 1. maja 2010. godine održava se peta
Europska sedmica imunizacije.
Europska sedmica imunizacije promovira glavnu poruku da
je imunizacija svakog djeteta izuzetno važna, da sprečava
bolesti i štiti život. Slogan «**Spriječi. Zaštiti. Imuniziraj.**»
prenosi ovu poruku Regionom.

Od 24. aprila do 1. maja 2010. godine održava se peta
Europska sedmica imunizacije.
Europska sedmica imunizacije promovira glavnu poruku da
je imunizacija svakog djeteta izuzetno važna, da sprečava
bolesti i štiti život. Slogan «**Spriječi. Zaštiti. Imuniziraj.**»
prenosi ovu poruku Regionom.

Vakcine za djecu školskog uzrasta i adolescente

Vakcine nisu samo za bebe i malu djecu.


Zaštita koju dobijete vakcinama u ranom djetinjstvu vremenom oslabi.

Vakcine sprečavaju ozbiljne, ponekad po život opasne bolesti.

I školska djeca i mladi trebaju primiti preporučene vakcine.

Pitajte roditelje za vaš karton vakcinacije i sa liječnikom provjerite da li je sva potrebna vakcinacija provedena.

Čuvajte karton vakcinacije na sigurnom mjestu i ponesite ga sa sobom pri svakom posjetu liječniku.



Preporučena vakcinacija. Raspored: od 6 do 18 godina

Morbili, rubeola, parotitis

Vakcinacija protiv morbila, rubeole i parotitisa (MRP) vrši se prilikom upisa u osnovnu školu. To je druga doza MRP vakcine koju bi trebalo primiti. Prvu dozu je trebalo primiti sa 12 mjeseci.

Difterija, tetanus, poliomijelitis

U završnom razredu osnovne škole (14 godina) vrši se vakcinacija protiv difterije, tetanusa i poliomijelitisa (dT+OPV).

Tetanus

Vakcinu protiv tetanusa (TT) primaju mladi ljudi u završnom razredu srednje škole tj. u 18 godini.

Vakcine za djecu školskog uzrasta i adolescente

Vakcine nisu samo za bebe i malu djecu.

Zaštita koju dobijete vakcinama u ranom djetinjstvu vremenom oslabi.

Vakcine sprečavaju ozbiljne, ponekad po život opasne bolesti.

I školska djeca i mladi trebaju primiti preporučene vakcine.

Pitajte roditelje za vaš karton vakcinacije i sa liječnikom provjerite da li je sva potrebna vakcinacija provedena.

Čuvajte karton vakcinacije na sigurnom mjestu i ponesite ga sa sobom pri svakom posjetu liječniku.



Preporučena vakcinacija. Raspored: od 6 do 18 godina

Morbili, rubeola, parotitis

Vakcinacija protiv morbila, rubeole i parotitisa (MRP) vrši se prilikom upisa u osnovnu školu. To je druga doza MRP vakcine koju bi trebalo primiti. Prvu dozu je trebalo primiti sa 12 mjeseci.

Difterija, tetanus, poliomijelitis

U završnom razredu osnovne škole (14 godina) vrši se vakcinacija protiv difterije, tetanusa i poliomijelitisa (dT+OPV).

Tetanus

Vakcinu protiv tetanusa (TT) primaju mladi ljudi u završnom razredu srednje škole tj. u 18 godini.