

**Usporedba trenutnih smjernica o prestanku izolacije o slučajevima COVID-19**

	<b>Simptomatični slučajevi koji su hospitalizirani</b>	<b>Asimptomatične infekcije, ljudi koji su izolirani kod kuće</b>
<b>Ministarstvo zdravstva, Vrhovni savjet za zdravstvo, Italija (28.02.2020.)</b>	<p>Pacijent koji je zaražen sa COVID-19 se može smatrati izlijecenim nakon prestanka simptoma i 2 negativna testa na SARS-CoV-2 u intervalima od 24 sata.</p> <p>Za pacijente koji se klinički oporave prije nego prođe 7 dana od početka simptoma, savjetuje se interval od 7 dana između prvog i završnog testa.</p> <p>Napomena: Virusni klirens se definije kao nestanak virusnog RNA iz tjelesnih tekućina kod simptomatičnih i asimptomatičnih osoba, praćeno pojavom specifičnih imunoglobulina.</p>	Negativan SARS-CoV-2 RNA test 14 dana nakon prvog testa (kraj karantina)
<b>China CDC</b> Protokol za dijagnosticiranje i liječenje za COVID-19 pacijente (testna verzija 7, revidirana)	<p>Mogu se otpustiti pacijenti koji ispunjavaju sljedeće kriterije:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afebrilni duže od 3 dana,</li> <li>• Poboljšani respiratori simptomi,</li> <li>• RTG plućna pokazuje jasniju regresiju upale i,</li> <li>• testovi na bazi nukleinskih kiselina su negativni na gornje respiratorne patogene dvaput zaredom (interval uzorkovanja <math>\geq</math> 24 sata).</li> </ul> <p>Nakon otpuštanja kući, pacijentima se preporučuje da u narednih 14 dana nastave izolaciju i praćenje, nose masku, borave u jednoj prostoriji sa dobrom ventilacijom, reduciraju bliske kontakte sa članovima porodice, jedu odvojeno, održavaju higijenu ruku i izbjegavaju izlazak vani. Preporučuje se da se obave follow-up posjete otpuštenih pacijenata nakon 2 i 4 sedmice.</p>	
<b>Nacionalni centar za infektivne bolesti (NCID) Singapur</b>  Prestanak izolacije za sumnjive slučajeve COVID-19	<p>Otpustiti pacijenta kliničkim praćenjem ukoliko je to naznačeno i sa svakodnevnim telefonskim pozivima pacijenta do 14 dana od posljednjeg mogućeg izlaganja, pod sljedećim uvjetima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afebrilan <math>\geq</math> 24 sata,</li> <li>• 2 respiratorna uzorka testirana PCR testom negativna na SARS-CoV-2 u <math>\geq</math> 24 sata,</li> <li>• Trajanje bolesti od pojave simptoma <math>\geq</math> 6 dana</li> <li>• ILI</li> <li>• Otkrivena alternativna etiologija (npr. gripa, bakteremija)</li> <li>• ILI</li> <li>• Nije blizak kontakt sa COVID-19 slučajem.</li> <li>• Nije potrebno bolničko liječenje iz drugih razloga</li> </ul>	
	<p>Negativni rRT-PCR rezultati iz najmanje dva seta uzoraka nazofarinks i grla prikupljenih u razmaku <math>\geq</math> 24 sata kod pacijenta sa COVID-19 (ukupno 4 negativna uzorka)</p> <p>I prestankom visoke temperature, bez korištenja antipiretičkih lijekova, poboljšanje znakova i simptoma bolesti.</p>	

<b>CDC USA</b> Privremene smjernice za prestanak mjera predostrožnosti za transmisiju i otpuštanje hospitaliziranih pacijenata sa COVID-19	Napomena: odluka se treba donijeti ovisno od slučaja do slučaja u konsultaciji sa ljekarima i javnozdravstvenim radnicima.	
---	--	--

Prilikom odlučivanja o kriterijima za otpuštanje bolesnika s COVID-19 u bolnici, zdravstvene vlasti trebaju uzeti u obzir nekoliko čimbenika poput postojećeg kapaciteta zdravstvenog sistema, laboratorijskih dijagnostičkih sredstava i trenutne epidemiološke situacije