



CIJEPLJENJE PROTIV COVID-19: TRUDNICE I DOJILJE

Prije cijepljenja, trudnice dojilje bi trebale biti upoznate s :

- rizicima COVID-19 u trudnoći
- koristi cijepljenja u lokalnom epidemiološkom kontekstu
- nedostacima podataka o sigurnosti cjepiva

Prije cijepljenja nije potrebno obaviti test na trudnoću.

Nema razloga odlagati ili prekinuti trudnoću zbog cijepljenja.

NAJČEŠĆA PITANJA I KLJUČNE PORUKE

Jesu li trudnice izložene većem riziku komplikacija uzrokovanih COVID-19?

- Trudnice koje obole od COVID-19 imaju veću vjerovatnost za razvoj komplikacija (npr. upotreba mehaničke ventilacije, te prijem u jedinice intenzivne skrbi, itd.) u usporedbi sa ženama reproduktivne dobi koje nisu trudne.
- COVID-19 u trudnoći također je povezan s povećanim rizikom od prijevremenog poroda i primjenom neonatalne intenzivne skrbi.
- Trudnice koje su starije (≥ 35 godina) ili imaju visok indeks tjelesne mase (≥ 30) ili postojeći komorbiditet poput dijabetesa ili hipertenzije, u posebnom su riziku od ozbiljnih ishoda COVID-19.

Mogu li cjepiva protiv COVID-19 naštetiti plodu?

- Trudnice i dojilje nisu bile uključene u početna klinička ispitivanja cjepiva protiv COVID-19, te dugoročni podaci o sigurnosti cjepiva još uvijek nisu dostupni. Međutim, klinička ispitivanja su u tijeku.
- Podaci koji su do sada prikupljeni pokazali su da cjepiva nemaju negativan učinak na plod.
- Cjepiva nisu živa cjepiva, te ne mogu zaraziti ni majku ni plod s COVID-19.

Preporučuju li se cjepiva protiv COVID-19 trudnicama?

- SZO preporučuje cijepljenje trudnica kada koristi nadmašuju potencijalne rizike (npr. trudnice s visokim rizikom od izloženosti COVID-19 ili s komorbiditetima koji ih svrstavaju u skupinu visokorizičnih za teški oblik COVID-19).
- Trudnice i dojilje nisu bile uključene u početna klinička ispitivanja cjepiva protiv COVID-19, te dugoročni podaci o sigurnosti cjepiva još uvijek nisu dostupni. Međutim, klinička ispitivanja su u tijeku.
- Dostupni podaci iz ispitivanja na životinjama nisu pokazali štetne učinke u trudnoći.
- Veliki broj trudnica odlučilo se cijepiti u SAD-u, Velikoj Britaniji i drugim zemljama s visokim dohotkom. Sigurnosnim nadzorom nisu se ustanovile komplikacije povezane s cijepljenjem trudnica.
- Cijepljenje bi trebalo zaštititi trudnice kao i sve ostale. Učinkovitost cjepiva vjerojatno će se usporediti sa ženama koje nisu trudne; početne studije pokazuju da su imunološki odgovori nakon cijepljenja slični.



NAJČEŠĆA PITANJA I KLJUČNE PORUKE

Preporučuju li se cjeviva protiv COVID-19 dojiljama?

- SZO preporučuje cijepljenje dojiljama (očekuje se da će učinkovitost i sigurnost cjeviva biti slična kao i kod ostale populacije).
- Dojenje ima značajne prednosti i za dijete i za majku.
- Trenutačno nema podataka o sigurnosti cjeviva protiv COVID-19 u dojilja i dojenčadi. Međutim, cjeviva protiv COVID-19 vjerovatno ne predstavljaju rizik za dojenče.
- SZO preporučuje nastavak dojenja nakon cijepljenja.

Koja je korist cijepljenja trudnica i dojilja cjevivima protiv COVID-19?

- Budući da su trudnice ili dojilje izložene većem riziku od izloženosti i/ili teške bolesti (u slučaju da su zdravstveni djelatnici ili imaju određeni komorbiditet), cijepljenje će im pomoći u zaštiti od COVID-19.

Izvor: SZO ([Coronavirus \(who.int\)](https://www.who.int))