

Što trebate znati o Johnson & Johnson's, Janssen (J&J, Janssen) cjepivu protiv COVID-19

Postoji rizik od rijetkog, ali ozbiljnog stanja koje uključuje stvaranje krvnih ugrušaka i pad broja trombocita u ljudi nakon primanja cjepiva J&J/Janssen protiv COVID-19. Ipak, rizik je vrlo nizak.

Ova komplikacija je rijetko stanje i dogodila se u oko 7 na milijun cijepjenih žena između 18 i 49 godina.

Kod žena od 50 i više godina i starijih muškaraca, ovo stanje je još rjeđe.



TREBAM LI SE I DALJE CIJEPITI ovim ili drugim cjepivima kako bi se zaštitio od COVID-19?

DA, stručnjaci se slažu da sva cjepiva protiv COVID-19 pomažu u sprječavanju bolesti COVID-19, posebno u sprječavanju težih oblika bolesti i smrti.

Poznate i potencijalne koristi svih cjepiva protiv COVID-19 nadmašuju poznate i potencijalne rizike.

Potrebna vam je samo jedna doza cjepiva J&J/Janssen.

Što ako sam već primio cjepivo J&J/Janssen protiv COVID-19?

Tri tjedna nakon primanja J&J/Janssen cjepiva, trebate paziti na moguće simptome stvaranja krvnih ugrušaka sa niskim trombocitima, poput:

Jaka glavobolja ili zamućen vid

Kratkoća daha

Bol u prsima

Oticanje nogu

Bol u trbuhu koja ne prolazi

Lako stvaranje modrica i sitna krvarenja pod kožom

Ukoliko primjetite bilo koji od ovih simptoma odmah se obratite liječniku.

Izvor: CDC (www.cdc.gov/coronavirus)

Informacije o drugim cjepivima protiv COVID-19 dostupne su na službenoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (<https://www.zzjzfbih.ba>).