

NADZOR NAD GRIPOM U FEDERACIJI BiH SEZONA 2024./2025. GODINA

Izvještaj za 40. tjedan/sedmicu (od 30.09.2024. do 6.10.2024.)

- Kao i svake godine, od 40. tjedna/sedmice tekuće godine do 20. tjedna/sedmice naredne godine, provodi se nadzor nad sezonskom gripom.
- U 40. tjednu/sedmici, uzeta su dva uzorka na ILI sentinel mjestu DZ Novi Grad, tri uzorka na ILI sentinel mjestu DZ Mostar- Ambulanta Rudnik i osam uzoraka na SARI sentinel mjestu UKC Sarajevo, koji su nakon testiranja bili negativni na gripu. Dva su uzorka bila pozitivna na SARS-CoV-2.
- Uspostavljen je integrirani sustav nadzora nad gripom, COVID-19 i RSV u sentinel jedinici UKC Sarajevo, koji se nastavlja u tekućoj sezoni.

I. Definicija slučaja ILI - bolest slična gripi je:

Akutna respiratorna infekcija sa:

- izmjerenom temperaturom $\geq 38^{\circ}$ C;
- kašljom;
- pojavom simptoma u zadnjih 10 dana.

II. Definicija slučaja ARI - akutna respiratorna infekcija je:

Akutno izbijanje simptoma i respiratorna infekcija, definirana najmanje jednim od sljedećih simptoma:

- kašalj;
- grlobolja;
- „kratkoća daha“ (zbog kongestije sluznice gornjih dišnih putova);
- hunjavica.

Napomena: ARI može biti sa ili bez povišene temperature.



III. Definicija slučaja za SARI - teška akutna respiratorna infekcija

Akutna respiratorna infekcija sa:

- historijom povišene temperature ili izmjerenom povišenom temperaturom $\geq 38\text{ C}^\circ$;
- kašljom;
- pojavom unutar zadnjih 10 dana;
- i zahtjeva hospitalizaciju.

Napomena: SARI nije ekvivalent klasičnoj upali pluća. Očekivati je da će mnoge teške respiratorne bolesti biti povezane s gripom zbog egzacerbacije kronične bolesti npr. pluća ili srca, što ne uključuje prijemnu dijagnozu „upala pluća“.

Dobna stratifikacija podataka

Tjedno prikupljanje podataka o ILI, ARI i SARI obavlja se prema uniformnim dobnim skupinama:

- 0-4 godina,
- 5-14 godina,
- 15-29 godina,
- 30-64 godina,
- ≥ 65 godina.