

NADZOR NAD RESPIRATORNIM VIRUSIMA U FEDERACIJI BiH

SEZONA 2026./2027. GODINA

Izvještaj za 40. tjedan/sedmicu (od 28.09.2026. do 04.10.2026.)

- Nadzor nad respiratornim virusima (gripa, SARS-CoV-2, RSV) sezonski se provodi od 40. tjedna/sedmice tekuće godine do 20. tjedna/sedmice naredne godine.
- U Federaciji BiH se provodi sveobuhvatan sustav nadzora nad respiratornim virusima koji obuhvaća praćenje akutnih respiratornih infekcija (ARI), bolesti slične gripi (ILI), kao i teških akutnih respiratornih infekcija (SARI), s ciljem ranog otkrivanja cirkulacije virusa i praćenja intenziteta aktivnosti respiratornih infekcija.
- U sezoni 2026./2027. nastavlja se integrirani sentinel nadzor nad gripom, COVID-19 i RSV-om, uz proširenje mreže sentinel jedinica. SARI sentinel nadzor provoditi će se u tri klinička centra: Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Univerzitetском kliničkom centru Tuzla i Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. ILI sentinel nadzor provoditi će se na tri mjesta primarne zdravstvene zaštite: DZ Novi Grad, DZ Mostar – Ambulanta Rudnik i DZ Tuzla.
- U 40. tjednu/sedmici testirano je 19 uzoraka (1 ILI i 18 SARI), koji su bili negativni na respiratorne viruse.

I. Definicija slučaja ILI - bolest slična gripi je:

Akutna respiratorna infekcija sa:

- izmjerenom temperaturom $\geq 38^{\circ}\text{C}$;
- kašljom;
- pojavom simptoma u zadnjih 10 dana.

II. Definicija slučaja ARI - akutna respiratorna infekcija je:

Akutno izbijanje simptoma i respiratorna infekcija, definirana najmanje jednim od sljedećih simptoma:

- kašalj;
- grlobolja;
- „kratkoća daha“ (zbog kongestije sluznice gornjih dišnih putova);
- hunjavica.

Napomena: ARI može biti sa ili bez povišene temperature.

III. Definicija slučaja za SARI - teška akutna respiratorna infekcija

Akutna respiratorna infekcija sa:

- historijom povišene temperature ili izmjerenom povišenom temperaturom $\geq 38\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- kašljom;
- pojavom unutar zadnjih 10 dana;
- i zahtjeva hospitalizaciju.

Napomena: SARI nije ekvivalent klasičnoj upali pluća. Očekivati je da će mnoge teške respiratorne bolesti biti povezane s gripom zbog egzacerbacije kronične bolesti npr. pluća ili srca, što ne uključuje prijemnu dijagnozu „upala pluća“.

Dobna stratifikacija podataka

Tjedno prikupljanje podataka o ILI, ARI i SARI obavlja se prema uniformnim dobnim skupinama:

- 0-4 godina,
- 5-14 godina,
- 15-29 godina,
- 30-64 godina,
- ≥ 65 godina.